

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈化膿性皮膚疾患用薬〉

第②類医薬品

化膿をともなう湿疹、皮膚炎に

テラ・コートリル[®] 軟膏_a

- テラ・コートリル軟膏 a は優れた抗炎症作用を示すヒドロコルチゾン（副腎皮質ステロイド）とグラム陽性菌及び陰性菌などに広い抗菌力を示すオキシテトラサイクリン塩酸塩を配合しています。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 抗生物質又は副腎皮質ホルモンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等のある患部。
 - (2) 湿潤やただれのひどい患部。
 - (3) 深い傷やひどいやけどの患部。
 - (4) 目や目の周囲。
3. 顔面には、広範囲に使用しないでください
4. 化粧用やひげそり後用として使用しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 患部が広範囲の人。
 - (6) 小児。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん
化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布するかガーゼなどにのばして貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) この医薬品を塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

【成分・分量】

テラ・コートリル軟膏aは淡黄～黄色の軟膏で1g中の成分・分量は次のとおりです。

成 分	分 量
オキシテトラサイクリン塩酸塩	30mg（力価）
ヒドロコルチゾン	10mg

添加物として白色ワセリン、流動パラフィンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限（外箱及びチューブに記載）をすぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本剤は黄色の軟膏ですので、衣服への付着に注意してください。

【包装】

テラ・コートリル軟膏a 6g

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎0120-834389

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

【製造販売元】

株式会社 陽進堂

〒939-2723 富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

【販売元】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

【販売提携】

武田薬品工業株式会社